

ГИПОГЛИКЕМИЯ




Уровень глюкозы плазмы менее 3,9 ммоль/л


Симптомы легкой гипогликемии

- Бледность
- Сердцебиение
- Головокружение
- Чувство голода
- Беспокойство
- Страх
- Слабость
- Потливость
- Дрожь в теле


Лечение легкой гипогликемии




4 куска сахара



1 стакан фруктового сока



3 чайные ложки меда



1 стакан газированной воды на сахаре



Симптомы тяжелой гипогликемии

- Спутанность мыслей
- Плохая координация
- Нарушение речи
- Потеря сознания
- Судороги
- Кома

Лечение тяжелой гипогликемии

1


2

3


4



**Вызвать
врача**



Положить пациента на бок; удалить остатки пищи изо рта



Передать медицинскому персоналу для введения 1 мг глюкагона или 40%-го раствора глюкозы¹



После восстановления сознания дать выпить 200 мл сока и съесть кусочек хлеба

Адаптировано из: Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 10-й выпуск (дополненный). М.; 2021. DOI: 10.14341/DM.12802.

Материал подготовлен в целях повышения информированности пациентов о заболевании и не заменяет консультацию врача

RU22DI00050

**Движущая
сила** | в лечении
диабета



ООО «Ново Нордиск»

Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956-11-32, факс: +7 (495) 956-50-13
www.novonordisk.ru • www.novonordisk.com